

RIMPELBEHANDELING

Rimpelbehandeling

Inleiding

Rimpels zijn een grote bron van ergernis voor veel mensen. Ze ontstaan geleidelijk en nemen toe naarmate men ouder wordt. Rimpels ontstaan door een verminderde elasticiteit van het bindweefsel, door een afname van het weefselvolume, door de inwerking van de zwaartekracht en door het normale gebruik van uw aangezichtsspieren.

Een gezonde huid zal minder snel rimpelen dan een huid die een tekort heeft aan bepaalde essentiële bestanddelen (vocht, vitamines, goede structuur). Geregelde verzorging van uw huid helpt zeker om rimpelvorming te voorkomen. Een schoonheidsspecialiste kan hier een belangrijke rol spelen. Als er al rimpels zijn en uw huidconditie is geoptimaliseerd, zijn er verschillende opties om rimpels te behandelen:

- aangezien het weefselvolume verminderd is onder de huid kunnen we iets onder de huid aanbrengen om het volume terug te brengen
- de activiteit van bepaalde spieren die rimpels veroorzaken kunnen we verminderen met botuline toxines
- als de rimpels te diep zijn kunnen we de huid gladder maken met een diepe peeling of met een laserbehandeling
- ten slotte zijn er dan diverse operatieve behandelingsopties

Doordat wij alle behandelingsopties beheersen kunnen wij u optimaal informeren over de behandeling die het best past bij uw situatie en die is afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Vorbereiding

Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn uw genetische aanleg, de blootstelling aan de zon en de huidverzorging. Uw aanleg om rimpels te krijgen kan u niet veranderen. Belangrijke factoren die de kwaliteit van de huid aantasten kan u echter wel beïnvloeden. De belangrijkste zijn stoppen met roken en zonbescherming gebruiken. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u het gebruik van deze medicijnen drie tot tien dagen vóór de behandeling staken. U krijgt hierover instructies van de behandelende arts. Als u

wordt opgenomen voor een ingreep wordt uw algemene gezondheid vooraf onderzocht door de huisarts. Hierbij wordt dan een bloedonderzoek verricht, eventueel wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt en soms zijn nog andere onderzoeken nodig zoals een röntgenfoto van de longen. De dag van opname komt de anesthesist (indien mogelijk) bij u langs om de narcose te bespreken.

Volume toevoegen

Het volume neemt af op verschillende niveaus. De kaak wordt met ouder worden dunner, waardoor bijvoorbeeld vaak rimpeltjes rond de mond ontstaan. In combinatie met de vermindering van het onderhuidse vetweefsel en de verslapping van de gelaatsspieren wordt dit effect nog versterkt. Fijne rimpels kunnen gecorrigeerd worden door injectie van een product juist onder of net in de huid. Hiervoor bestaat een grote hoeveelheid producten. We onderscheiden 3 groepen: de oplosbare producten, de niet-oplosbare producten en de lichaamseigen producten.

Als oplosbaar product kiezen wij meestal voor hyaluronzuur, dit is een lichaamseigen stof die langzaam wordt afgebroken door het lichaam. De behandeling moet dan ook herhaald worden. Aangezien de ene mens dit product sneller afbreekt dan de ander blijft het resultaat bij de één ook langer behouden dan bij de ander.

Niet-oplosbare producten geven een permanent resultaat en worden dus maar eenmalig ingebracht. Let wel: zij zijn permanent. Als u zich bedenkt kunnen zij niet (of zeer moeilijk) verwijderd worden! Wij raden mensen die nog niet vertrouwd zijn met deze technieken dan ook aan eerst voor een oplosbaar product te kiezen. Als men tevreden is over het resultaat kan men daarna voor een permanente optie kiezen.

Ten slotte kan men kiezen voor een lichaamseigen product, namelijk eigen vetweefsel. We nemen dit bijvoorbeeld uit de buik, behandelen het en spuiten het dan in kleine hoeveelheden weer in, de zogenaamde lipostructuur. Hiermee zijn goede resultaten te verkrijgen als de vetcellen blijven leven. Daarom is het ook belangrijk slechts kleine hoeveelheden per keer in te brengen, wat een grotere kans op overleving van de cellen als gevolg heeft.

NIJMEGEN
KNOKKE
GENT

Botuline toxine om spieractiviteit te verminderen

Dit middel vermindert de spieractiviteit van bepaalde aangezichtsspierjes. Hierdoor zal uw huid gladder zijn. De normale gelaatsuitdrukking zal daarbij niet aangetast worden. Het eerste effect ziet u na 3 dagen tot een week en meestal houdt het effect ongeveer 3 tot 6 maanden aan. Als u meer informatie wenst over deze behandeling, vraagt u dan onze aparte folder over Botuline toxine behandeling.

Peeling en laserbehandeling om de elasticiteit te verbeteren

Om de elasticiteit te verbeteren kan naast uw eigen huidverzorging, of deze door een de schoonheidsspecialiste, ook voor een peeling of een laserbehandeling worden gekozen. Bij een peeling wordt een vloeistof op de huid aangebracht die de oppervlakkige cellaag verwijdert. Hierdoor wordt de huid gestimuleerd nieuw bindweefsel aan te maken. Ook bij een laserbehandeling worden kleine laagjes huid heel precies verwijderd. Hierdoor vervagen de rimpels aanzienlijk. Een typisch voorbeeld is de behandeling van de rimpels rond de mond. Zie ook de aparte folder.

Operatieve rimpelbehandelingen

Niet alle rimpels kunnen met bovenbeschreven opties gecorrigeerd worden. Wallen onder de ogen moeten vaak gecorrigeerd worden met een onderooglidcorrectie. Als er huid over de oogleden hangt die u een droevig uiterlijk bezorgt, kan deze huid gecorrigeerd worden met een bovenooglidcorrectie. Andere rimpelcorrigerende behandelingen zijn: de voorhoofdslift, de face/halslift en de MACS-lift of S-lift. Deze laatste is een recente ontwikkeling van een ingreep met minder uitgebreide littekens en kortere herstelperiode. Van deze operatieve ingrepen zijn aparte folders bij ons beschikbaar.

Risico's en complicaties

Wij geloven in de weg der geleidelijkheid. Dat wil zeggen dat we correctie van rimpels voorzichtig opbouwen

om complicaties en teleurstelling bij de patiënt te voorkomen. Nochtans kunnen kleine zwellingen, asymmetrie of onvoldoende verdwijnen van de rimpels zich voordoen. Van de inspuitingen merkt u meestal weinig. Soms is er een geringe roodheid, zeldzamer is een infectie van de punctieplaats en zeer zelden kan een allergie optreden. Bij het gebruik van botuline toxine kunnen occasioneel ernaast liggende spieren minder gaan werken. Het meest hinderlijk is een hangend bovenooglid, wat echter zelden voorkomt. Voor de risico's en complicaties van laserbehandelingen en operatieve ingrepen verwijzen we naar de respectieve folders.

Terug naar de normale routine met uw nieuw uiterlijk

De resultaten van rimpelbehandeling stemmen meestal tot tevredenheid. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor een goed resultaat of voor een absolute symmetrie. Als de behandeling vooraf goed is doorgesproken is er meestal een adequaat verwachtingspatroon, waardoor de patiënt de resultaten meer weet te waarderen. Vrijblijvende poliklinische controles zijn voorzien.

Ten slotte

Deze folder bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen vooraf op papier te zetten. Indien u nog aanvullende informatie zoekt kan u die vinden via onze website www.esthetiek-groep.com op het internet.



Esthetiek Nijmegen

In: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Nederland

Telefoon: +31 24 365 8060

E- mail: secretariaat@esthetiek-nijmegen.com

Web: www.esthetiek-nijmegen.com



Esthetiek Knokke

In: VZW Gezondheidszorg Oostkust
AZ Koningin Fabiola AZ OLV ter Linden
Dr Verhaeghestraat 1 Graaf Jansdijk 162
8370 Blankenberge 8300 Knokke- Heist
België België

Telefoon: +32 50 633 033

E- mail: secretariaat@esthetiek-knokke.com

Web: www.esthetiek-knokke.com



Esthetiek Gent

Franklin Rooseveltlaan 327
9000 Gent,
België

Telefoon: +32 9 233 7707

E- mail: secretariaat@esthetiek-gent.com

Web: www.esthetiek-gent.com